

“ L'Echange ”, Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC. Rédacteur

Opuscula martialis

VI

(20 Février 1942)

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHien, 15

Une nouvelle année commence. Que sera-t-elle ? Souhaitons-la bonne à tous. Les événements ont entravé les relations suivies, interrompu les communications générales, mais je n'oublie pas les abonnés de *L'Echange* et mes nombreux correspondants anciens ; à tous, j'adresse mes vœux les meilleurs, en les assurant que, dans mon silence, je leur conserve un bon souvenir. Le présent fascicule est composé sur le modèle des précédents et rédigé de même. Les types des nouveautés qui suivent sont dans ma collection et les numéros de *Opuscula martialis* sont vendus par le Directeur de *L'Echange*.

Conizonia bicoloricornis n. sp. ♂ [Ceramb.]. Niger, sat uniformiter, scutello suturaque densiore, albo-griseo pubescens, antennis rufis, ad basin nigris, his parum robustis, sat brevibus ; thorace subtransverso ; elytris sat brevibus, attenuatis, apice oblique rotundatis ; pygidio breve, apice truncato. Long. 13 mill. Algérie : Saïda (Pic). — Se rapproche de *Poweli* Pic par son revêtement uniforme, grisâtre, mais différent par ses antennes en partie rousses et plus robustes, la suture plus densément pubescente ; diffère, d'autre part, de *aumontiana* Luc. par les antennes nettement bicolores.

C. invittata n. sp. Minutus, postice paulo attenuatus, opacus, niger, dense griseo-luteo pubescens, thorace in disco, externe fulvo-brunneo vittato ; elytris in singulo ad basin breve et parum distincte fulvo notatis, lateraliter fulvo-brunneo vittatis ; antennis rufescentibus, articulo primo nigro. Long. 12 mill. Tunisie. — Petite espèce, voisine de *Leprieuri* Pic et distincte, à première vue, par les élytres dépourvus de bandes présuturales brunes.

Dictyopterus forticornis [Lycide]. Parum robustus, opacus, niger, supra ruber ; antennis robustis, filiformibus, articulo 3^o robusto, 2^o paulo longiore ; thorace pa-

rum transverso, quinque et fortiter areolato ; elytris parum elongatis, 4-costatis, intervallis parum regulariter bifenestratis. Long. 9 m. Chine. — Voisin de *aurora* Her., antennes plus robustes, sculpture élytrale moins régulière.

Pyropterus diversicollis n. sp. [Lycide]. Parum robustus, opacus, niger, membris pro parte rubro pubescens, supra ruber ; antennis robustis, articulis 2°-3° minutis ; thorace subquadrato, antice subarcuato, supra inaequale areolato, areola mediana antice pro parte divisa ; elytris parum elongatis, 4-costatis, intervallis minute sat regulariter bifenestrato-punctatis. L. 7 m. Kioto. — Caractérisé par la particulière structure du thorax.

Aplopterus japonicus n. sp. [Lycide]. Oblongus, sat latus, parum nitidus, niger, thorace paulo fulvo pubescente, transverso, medio carinato, lateraliter arcuate plicato, inde 4-areolato ; elytris ad humeros et antice, in costis, pro parte et diverse aurantiacis, his latis, thorace latioribus. L. 10 m. Yezo. — Diffère de *rubens* Gyl. par le 3^e article des antennes plus long, l'aspect plus robuste, la coloration plus foncée.

Zonabris trifasciata v. nov. interneobliterata [Hét.]. Fascia prima nigra elytrorum reducta, interne late oblitterata. S. Leone.

Z. natalensis n. sp. Parum elongatus, paulo fusco pubescens, nitidissimus, niger, elytris luteo trifasciatis ; fascia prima prebasalis, ad suturam interrupta, secunda premediana, sat lata, paulo sinuata, tertia anteapicalis, undulata, intus latiora ; antennis late rufis. Long. 15 mill. Natal. — Peut se placer près de *dubiosa* Mars.

Z. bifasciata v. nov. medioisolata. Cette variété a les élytres noirs aux extrémités, roux au milieu, avec une bande étroite rousse isolée de la suture. Côte-d'Ivoire.

Z. Le Moulti Pic. A nommer les var. suivantes : *v. discounimaculata*, élytres jaunes en avant avec une courte ligne noire sur la suture et aux épaules, maculés de noir sur le disque, noirs postérieurement avec une fascie jaune sinuée, de Dimbroko ; *v. nov. atrosuturalis*, élytres jaunes à suture et sommet largement noirs, avec, sur le milieu, deux fascies noires sinuées, une macule humérale noire, de Dimbroko.

Z. bicoloricornis n. sp. Elongatus, griseo pubescens, subnitidus, niger, elytris luteis, sutura et apice late nigris, ad medium sinuata nigro bifasciatis, ad humeros nigro maculatis, antennis rufis, ad basin nigris. Long. 10 mill. Côte-d'Ivoire. — Voisin de *Le Moulti* Pic, mais antennes bicolores.

Z. Neevorti v. nov. Meloni. Niger, elytris ad basin et ad medium intus luteo notatis, postice luteo fasciatis. Côte-d'Ivoire.

Decatoma undata v. nov. fenestrata [Hét.]. Antennae nigrae, elytris nigrae, luteo bifasciatis et antice luteo bivittatis, vittis ad fasciam junctis. Transvaal.

D. histrio v. nov. interrupta. Fascia prima luteo elytrorum interrupta. Afr. M^{le}.

D. histrio v. nov. multiinterrupta. Elytris nigrae, ad basin et ante medium luteo fasciatis, fascia prima externe divisa, post medium et ante apicem multi et diverse luteo maculatis. Orange.

Decatoma postbimaculata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in singulo luteo signatis : macula prescutellaris arcuata, macula ante-mediana sinuata, linea externa prehumeralis postice dilatata, fascia sinuata postmediana et maculis duabus ad apicem ; antennae elongatis, nigrae, apice rufis. Long. 12 mill. S. Leone. — Caractérisé par les dessins jaunes des élytres particuliers.

D. latefasciata n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in singulo luteo signatis : ad basin et ad medium late sinuate fasciatis, fasciis lateraliter junctis, post medium interrupte fasciatis ; antennis brevibus, nigris, apice rufis. Long. 12 mill. Katanga. — Espèce caractérisée par ses larges bandes jaunes, la première étant très avancée sur la base.

D. caffra v. nov. *latenotata*. Niger, atropilosus, elytris ad scutellum grande luteo maculatis, ad et post medium late luteo sinuate fasciatis, antennis brevibus, nigris, apice rufis. Le Cap.

Actenodia chrysomelina v. nov. *juncta* [Hét.]. Fasciis nigris elytrorum in disco junctis. Afr. M^{le}.

Ceroctis congoana Duv. A nommer les var. suivantes, du Congo : *v. communis*, élytres ayant trois fascies noires, la 1^{re} complète remontant sur la suture et vers les épaules ; *v. paulodivisa*, élytres ayant trois fascies noires, la première remontant sur les épaules, mais isolée de la suture ; *v. sinuatecincta*, à élytres noirs, avec les côtés à marge sinuée rougeâtre, en plus avec une fascie réduite rousse postmédiane, sommet bordé de roux.

C. angustata n. sp. Angustatus, dense argenteo pubescens et dense punctatus, niger, pro parte subæneus, elytris luteis, signaturis nigris ornatis : vitta antica externa sinuata, ad medium strangulata, antice in disco, post medium ad suturam nigro maculatis (*forma typica*), aliquot signaturis nigris, ad suturam connexis (*v. biconnexa*), apice nigris et luteo maculatis. Long. 14 mill. Afr. M^{le}. — Voisin de *tangana* Pic, plus étroit et plus densément pubescent.

C. angustata v. nov. *immaculata*. Macula nigra discoidalis oblitterata et fascia postmediana completa. — Congo.

C. 4-fasciata v. nov. postreducta. Niger, elytris luteis, in singulo antice nigro bimaculatis, ad medium nigro fasciatis, ante apicem externe nigro sinuate fasciatis, apice nigro notatis. Le Cap.

C. Gyllenhali v. nov. Brauni. Niger, elytris in singulo antice 4 (2,2) luteo maculatis, post medium et ante apicem luteo fasciatis. Afr. M^{le}. — La var. nov. *medio-bifasciata*, du Cap, a deux fascies au milieu des élytres avec des macules basales et préapicale.

C. bunkeyana v. nov. subjuncta. Vittis luteis elytrorum postice junctis. Congo.

Mordella nigroapicalis n. sp. [Hét.]. Angustatus, postice attenuatus, griseo pubescens, niger, elytris rufis, apice nigris, ante apicem albo-faciatis, sutura nigra, infra corpore lateraliter albo notato. Long. 6 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par sa forme allongée jointe à sa particulière coloration élytrale.

Mordellistena bistrigosa n. sp. [Hét.]. Minutus, angustatus, griseo pubescens, rufo-testaceus, tibiis posticis nigro-bistrigosis, striga prima longissima. Long. 2 mill. Tonkin. — Voisin de *minuscula* Pic.

Eleale simplex v. nov. bicoloricornis. Antennes rembrunies avec la massue rousse et le dernier article transversal ; écusson blanc ; élytres peu brillants, à forte sculpture. Australie.

E. speculum v. nov. tasmanica. Coloration verdâtre avec reflets bronzés en dessus ; antennes foncées, rousses à l'extrémité, dernier article tronqué et un peu échancré au sommet ; élytres à ponctuation dense et irrégulièrement disposée. Tasmanie.

Bruchus Vadoni n. sp. [Bruc.]. Elongatus, nitidus, griseo aut albo, pro parte dense pubescens, niger, an-

tennis ad basin pedibusque rufis, antennis sat robustis et elongatis; thorace obconico, lateraliter subsinuato, ante angustato, minute et dense punctato, medio albo lineato; scutello albo pubescente; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, subparallelis, postice attenuatis, post scutellum breve albo lineatis, distincte striatis et dense punctatis; pygidio albo pubescente; pedibus posticis parum crassis, femoribus inermibus. Long. 3 mill. Tananarive. — A placer près de *nigritarsis* Frm.

B. multialbolineatus n. sp. Oblongus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, pro parte rufus, thorace ad basin medio albo notato, scutello albo pubescente; elytris diverse et reducte albo lineatis, membris rufis; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis, illo obconico; elytris parum elongatis, nigris, circa pro parte aut diverse rufo marginatis; pygidio nigro, medio albo lineato; pedibus posticis validis, femoribus apice sat fortiter et breve dentatis, tibiis carinatis. Long. 5 mill. Guinée. — Peut se placer près de *phaseoli* L.

B. diversedenudatus n. sp. Oblongus, sat dense griseo pubescens, pro parte denudatus, niger, antennis ad basin et pedibus 4 anticis testaceis; thorace obconico, parum fortiter sat dense punctato, postice medio griseo notato; elytris parum elongatis, griseo pubescentibus, in disco punctato aut breve lineato nigris, lateraliter medio bifasciatis, fasciis pro parte junctis, apice nigro sinuate marginatis; pygidio dense albo pubescente; pedibus posticis nigris, validis, femoribus apice breve dentatis. Long. 3 mill. Soudan. — Moins allongé que le précédent, avec des dessins différents, les pattes postérieures noires.

B. subcallosus n. sp. Oblongus, subopacus, niger, supra griseo-albo tessellatus, antennis ad basin et apice, pedibus 4 anticis et tarsis posticis testaceis; capite medio carinato; antennis nigris, articulis 4 primis et ultimo

apice testaceis, articulis 5 et sequentibus longe pectinatis, thorace obconico, postice medio paulo elevato, ante scutellum paulo pubescente ; elytris sat brevibus, minute striatis ; pedibus posticis sat validis, inspinosis. Long. 2 mill. Kenya. — Ressemble à *chinenensis* L., en diffère par la coloration générale foncée, l'absence de callosité blanche au thorax.

B. (*Callosobruchus*) *griseocallosus* n. sp. Oblongus, nitidus, pro parte griseo pubescens, niger, antennis ad basin et apice pedibusque 4 anticis pro parte testaceis ; antennis parum gracilibus, sat elongatis ; thorace obconico, ad basin medio griseo bimaculato, dense pupillato-punctato ; elytris sat brevibus, subarcuatis, minute striatis, ad suturam sinuate griseo pubescentibus, transverse et irregulariter late griseo trifasciatis ; pedibus posticis sat validis, femoribus ante apicem distincte dentatis. Long. 2 mill. Erythrée. — Espèce caractérisée par les callosités du thorax non brillantes et le revêtement élytral particulier.

Spermophagus senegalensis v. nov. **nigrodenuatus** [Bruc.]. Niger, griseo pubescens, elytris multi denudate inaculatis. Sénégal. — Le *senegalensis* mihi est petit, noir, pubescent de gris avec quelques parties dénudées disposées transversalement sur trois ou deux rangées.

Cyphon Coomani n. sp. [Hél.]. Oblongo-subelongatus, postice sat attenuatus, sparse griseo pubescens, nitidus, niger, membris testaceis, capite parum rufescente, fortiter et dense punctato ; thorace parum breve et lato, sat minute et dense punctato ; scutello triangulare ; elytris thorace sat latioribus, humeris subrotundatis, parum elongatis, postice attenuatus, ad suturam postice depresso, minute sat sparse punctatis, distincte et reducte costulatis. Long. 2,5 mill. Tonkin. — A placer près de *Savitchi* Pic.

C. tonkineus n. sp. ; du Tonkin, voisin du précédent, est noir avec l'avant-corps plus ou moins teinté de roux, les épaules et la suture marquées, ou non, de roux, la base des antennes et les pattes sont testacées, l'avant-corps a une ponctuation assez forte et dense, tandis que celle des élytres est écartée.

Scirtes Nodieri n. sp. [Hél.]. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, parum nitidus, niger, thorace lateraliter, elytris ad suturam et apicem rufo marginatis, pedibus rufis et nigris ; thorace breve et lato, lateraliter valde deplanato, minute et sparse punctato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, antice fortiter impressis, sat minute et dense punctatis. Long. 4 mill. Guyane. — Peut se placer près de *oblongus* Chp.

Artematopus apicalis n. sp. [Hél.]. Minutus, oblongus, griseo pubescens, nitidus, infra rufo-brunneus, membris rufis, supra niger, elytris apice testaceis, his minute striato-punctatis, intervallis deplanatis. Long. 4 mill. Colombie. — Peut se placer près de *luteonotatus* Pic.

Megalopus armatus Lac. Le ♂ de cette espèce varie par l'absence de la macule postérieure jaune des élytres, soit avec la bande médiane jaune raccourcie (*v. suboblitteratus*), soit avec cette bande divisée en macules (*v. interruptus*). Parfois, les élytres sont foncés avec, sur chacun, une très petite macule jaune (*v. subuniformis*). — Brésil.

Merilia lunulata v. nov. **trisignata** [Phy.]. Elytris lutes, ad humeros nigro maculatis, ante et post medium nigro fasciatis. Indes.

Aethomorpha latenigra n. sp. [Phy.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, elytris nigris, anguste rufo-marginatis, ad basin intus late rufis ; capite trifoveolato ; ely-

tris diverse pro majore parte lineato punctatis. Long. 4 mill. Pondichéry. — A placer près de *nigropicta* Lef.

Colaspoides Tenenbaumi n. sp. [Phy.]. Oblongus, convexus, nitidus, viridescens, supra, scutello excepto, cœruleus, antennis testaceis, apice piceis; thorace sat fortiter et disperse punctato; elytris latis et brevibus, postice attenuatis, antice externe paulo impressis, sat fortiter pro parte lineato punctatis. Long. 4,5-5 mill. Chine. — Voisin de *Paviei* Lef., mais dessus du corps en majeure partie bleu.

Colasposoma purpureocinctum n. sp. [Phy.]. Oblongo-elongatus, nitidus, supra glaber, viridi metallicus, pedibus pro parte, capite inter oculos, thorace elytrisque lateraliter aurato-purpureis; thorace sat minute et parum dense punctato; elytris sat elongatis, postice attenuatis, sat fortiter, pro parte regulariter non dense punctatis, externe paulo plicatis. Long. 7 mill. Afr. Oc. — Plus allongé que *Favareli* Pic, avec la ponctuation moins fine et moins écartée.

C. subpurpureum n. sp. Oblongus, latus, nitidus, supra fere glaber et alutaceus, infra pro majore parte cupreus, supra viridis et cupreo marginatus, antennis ad basin rufis; thorace minute et sparse punctato; elytris brevibus, postice attenuatis, subalutaceis, sat minute pro parte regulariter et sparse punctatis. Long. 6 mill. Delagoa-Bay. — Voisin de *Dejeani* Lef., en diffère par le fond alutacé, les pattes foncées, etc.

C. Donckieri n. sp. Oblongus, latus, supra glaber, infra sat sparse pubescens, nitidus, nigro-aeneus, antennis ad basin paulo rufis; capite alutaceo, sparse punctato; thorace sat fortiter non dense pupillato-punctato, medio lœve lineato; elytris brevibus, postice attenuatis, apice subalutaceis, diverse, irregulariter, non dense punctatis,

lateraliter paulo impressis. Long. 7,5 mill. Delagoa-Bay.
— Diffère du précédent par la forme plus convexe, l'aspect plus brillant, la coloration différente.

C. curtepilosum n. sp., de Lindi, voisin du précédent, est de coloration plutôt noire, plus grand et plus large, avec le thorax non particulièrement élargi sur les côtés postérieurs, à ponctuation générale un peu moins fine ; espèce très caractérisée par la présence, sur le dessus du corps, d'une pubescence blanche, courte et espacée.

C. Reygnaulti n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, supra glaber, nigro-aeneus, supra late aeneo-purpureus, circa pro parte viride cinctus, antennis rufis, apice piceis ; thorace minute sat dense pupillato-punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, pro parte minute, pro parte fortiter et dense punctatis, lateraliter paulo impressis. Long. 5 mill. Congo. — Voisin de *foveatum* Jac., avec une forme plus ramassée, les élytres sans impressions nettes.

C. Madoni n. sp. Oblongus, nitidus, supra fere glaber, rufo-testaceus, supra diverse aeneus, membris rufo-testaceis ; capite rufescente aeneo, medio impresso ; thorace aeneo viridescente, sat fortiter et dense pupillato-punctato ; elytris brevibus, postice attenuatis, parum fortiter et disperse punctatis, lateraliter paulo plicatis et impressis. Long. 5 mill. Sénégal. — A placer près de *sene-galensis* Cast., en diffère par la coloration largement claire du dessous et des pattes.

C. rufimembris n. sp., du Sénégal, voisin du précédent par ses membres roux, est noir en dessous, bronzé en dessus avec un étroit pourtour verdâtre ; caractérisé par la ponctuation plus forte et espacée de la tête, le thorax moins densément ponctué muni d'une petite dent aux angles postérieurs, la ponctuation moins forte, très nette et non embrouillée sur les côtés des élytres.

Lema guanajuatosa n. sp. [Phy.]. Oblongus, nitidus, infra corpore membrisque pro parte nigris, capite, thorace scutelloque rufis, elytris viridibus, latis, antice impressis, antennis gracilibus, nigris, infra et ad basin rufis, pedibus nigris, tibiis ad basin femoribusque testaceis, his diverse nigro notatis. Long. 4 mill. Mexique. — Voisin de *balsus* Bow., caractérisé par la coloration particulière de ses membres.

L. infratestacea n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris cyaneo-violaceis, antennis, articulo 1° excepto, tibiis apice tarsisque nigris ; thorace parum strangulato ; elytris antice impressis, parum brevibus. Long. 5 mill. Mexique. — Diffère de *spectabilis* Jac. au moins par le dessous du corps testacé.

L. realensis n. sp. Minutus, nitidus, nigro-olivaceus, elytris cupreis, antennis nigris, parum robustis ; thorace breve, sat lato, postice strangulato et transverse sulcato, diverse et irregulariter punctato ; elytris antice non impressis, irregulariter lineato punctatis et paulo striatis. Long. 2 mill. Mexique. — A placer près de *ceraria* Lac.

L. platanensis n. sp., de La Plata, analogue de coloration au précédent, mais avec l'avant-corps un peu cuivreux, est moins petit, le thorax est presque droit sur les côtés et un peu plissé, les antennes sont longues et grêles, un peu annelées de clair, les pattes plus ou moins rousâtres.

L. pruinosa n. sp. Oblongus, postice attenuatus, parum nitidus, breve griseo pubescens, nigro-olivaceus, antennis testaceo annulatis et femoribus diverse testaceis ; thorace fere quadrato, medio paulo strangulato, minutissime plicato ; elytris ad basin impressis, sat fortiter lineato-punctatis et paulo striatis. Long. 3 mill. Rio Janeiro. — A placer près de *obscura* F.

L. variesignata n. sp. Oblongo-subparallelus, niger, thorace pro majore parte elytrisque rufis, his ad suturam late nigro vittatis, apice nigro maculatis, lateraliter externe, antice reducte, nigro vittatis, postice nigro maculatis. Long. 6 mill. Brésil. — Caractérisé par ses dessins noirs divers particuliers.

L. discofasciata n. sp. Oblongus, elytris subarcuatis, rufo-testaceus, capite nigro, inter oculos rufo notato; collo rufo, antennis ad basin piceis, brevibus; thorace paulo elongato, parum minute punctato; elytris post humeros, ad suturam, reducte nigro-cæruleo fasciatis, antice vague impressis. Long. 6,5 mill. Bolivie. — Peut se placer près de *varipes* Lac., dessin des élytres particulier.

L. subsinuaticollis n. sp. Minutus, sat latus, niger, capite postice et thorace rufis, medio anguste nigro linearis, elytris rufis, diverse, pro parte fortiter punctatis, antice subquadrate impressis, membris nigris, articulo 1° antennarum femoribusque ad basin rufis. Long. 4,5 mill. Bogota. — Diffère de *seminigra* Lac. par la tête bicolore, le thorax avec une ligne foncée longitudinale.

L. grandicornis n. sp., de Bogota, plus petit et moins large que le précédent, est roux avec une macule oblongue apicale noire aux élytres, les antennes sont longues, foncées, avec le 1^{er} article roux, les élytres ont une profonde impression, avec une ponctuation forte, plus rapprochée, plus régulière.

Idgia Rouyeri v. n. mindanaosa [Mal.]. Angustatus, nitidus, testaceus, capite, antice excepto, nigro metallico, elytris viridibus, pedibus testaceis, femoribus apice tibiisque diverse piceis aut brunneis. Long. 10 mill. Mindanao. — Diffère de *Rouyeri* Pic par la tête testacée en avant, les antennes non en partie rembrunies.

Cladophorus nigroareolatus n. sp. [Mal.]. ♂. Elon-

gatus, niger, thorace aurantiaco, postice medio nigro notato, elytris aurantiacis ; antennis parum latis, articulo 3° et sequentibus ad medium longe flabellatis ; thorace parum transverso, antice subsinuato, angulis posticis paulo prominulis, distincte 5 areplato, areola postica media nigra ; elytris elongatis, intervallis fortiter, pro parte irregulariter, po parte subquadrate punctatis. Long. 9 mill. Tonkin. — Voisin de *prominulithorax* Pic, s'en distingue par le thorax différent, la plus forte sculpture des élytres.

C. angusteareolatus n. sp., du Tonkin, voisin du précédent, s'en distingue par l'aréole postérieure médiane du thorax plus étroite et testacée, cet organe moins large, la ponctuation des intervalles des élytres en partie rembrunie avec ces organes moins longs.

Cerogria africana n. sp. [Hét.]. Oblongo-elongatus, longe albo pubescens et hirsutus, nitidus, rufus, elytris brunneo subæneis, antennis nigris, ad basin rufis ; capite thoraceque fortiter et dense pupillato-punctatis, illo parum elongato ; antennis sat validis, articulis 7 et 9 latioribus, 9° extus paulo prolongato, ultimo mediocre longiore ; elytris latis et parum elongatis, apice attenuatis, fortiter sat dense punctatis et plicatis. Long. 7 mill. Kamerun. — Voisin de *congoana* Br., structure des antennes et coloration différentes.

Allocera obscura n. sp. [Hét.]. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-olivaceus, capite paulo æneo, inæquale, inter oculos impresso, antennis nigris, apice valde latioribus, articulis 4-7 apice diverse latioribus ; thorace sat breve et lato, lateraliter sinuato, multi et diverse impresso, diverse punctato ; elytris elongatis, apice attenuatis, sat fortiter, pro parte subregulariter punctatis. Long. 9 mill. Gabon. — Voisin de *foveifrons* Pic par l'impression de la tête plus allongée, les articles de la

base des antennes relativement grêles, la sculpture des élytres différente, etc.

Synallecula attenuata n. sp. [Hét.]. Subovatus, postice valde attenuatus, nitidus, griseo pubescens, castaneo rufescens, membris pallidioribus ; thorace sat minute et sparse punctato ; elytris thorace non latioribus, sat brevibus, longe attenuatis, minute striatis sed fortiore punctatis, intervallis diverse, pro parte regulariter lineato-punctatis. Long. 4 mill. Côte d'Ivoire. — Voisin de *punctaticeps* Pic, en diffère par les élytres plus longuement atténusés, la forme plus élargie.

S. congoana n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, rufus, antennis nigris, ad basin rufis ; thorace breve et lato, antice attenuato, minute et dense punctato-ruguloso ; elytris elongatis, postice valde attenuatis, antice depressis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 5 mill. Congo. — Peut se placer près de *Madoni* Pic.

S. diversicollis n. sp., du Gabon, voisin du précédent, un peu plus petit et plus atténué, à la tête en arrière et le disque du thorax rembrunis, les élytres sont plus larges sur la base et les stries sont plus faibles.

S. nigricornis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, membris nigris, femoribus ad basin rufis, tarsis pro parte luteis ; thorace breve et lato, sat dense pupillato-punctato, postice distincte biipresso ; elytris elongatis, postice attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis minutissime, uni aut bilineato-punctatis. Long. 5 mill. Cameroun. — Voisin de *gracilicornis* Pic, s'en distingue par les impressions nettes du thorax, les membres plus foncés.

S. breviceps n. sp. Sat angustatus, antice et postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, pro parte

obscurus, membris pro parte nigris ; oculis fere junctis, thorace breve et lato, dense pupillato-punctato ; elytris elongatis, subparallelis, postice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 6 mill. Gabon. — Voisin de *subparallelia* Pic, un peu plus étroit, yeux rapprochés, élytres à intervalles subconvexes et peu ponctués.

S. triimpressa n. sp., du Dahomey, ressemble au précédent, un peu plus grand, yeux écartés, thorax roux, moins large, nettement triimpressionné postérieurement, les points des intervalles plus marqués et plus nombreux.

S. seminigra n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, rufus, membris pro majore parte abdomine que nigris, elytris nigro-subæneis ; capite parum dense et thorace minute et densissime punctato ; antennis gracilibus, articulis 2 primis rufis ; elytris elongatis, postice attenuatis, distincte striato-punctatis, intervallis subde pressis, sat minute et multi-punctatis. Long. 7 mill. Cameroun. — Espèce caractérisée par sa grande taille, jointe à sa coloration. La var. *minuta*, de 5 mill., a les articles 3 et suivants des antennes moins allongés, les stries des élytres plus faibles.

S. palliditarsis n. sp. Oblongus, nitidus, luteo pubescens, rufus, tibiis et antennis, articulis 1° et ultimo exceptis nigris, tarsis diverse testaceis ; capite diverse et thorace sat dense punctatis ; oculis sat approximatis ; elytris parum elongatis, postice valde attenuatis, minute striatis, intervallis sat fortiter punctatis. Long. 4,5 mill. Cameroun. — La var. *obscurior* est presque entièrement noire, membres compris, avec le thorax à 2 impressions nettes, limitant la dépression.

Allecula Mocquerysi n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, subconvexus, sparse pubescens, abdo-

men pallidior, membris nigris, femoribus ad basin luteis; capite parum sparse et thorace dense punctatis, illo pa- rum breve, sat lato, ad basin paulo biimpresso; elytris elongatis, postice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis angustatis, minute punctatis. Long. 8 mill. — Gabon.

Allecula metallicipennis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, fere glaber, supra nigro-metallicus, elytris viridibus, infra rufus, membris nigris, fe- moribus late luteis; thorace subquadrato, sparse punc- tato; elytris minute striato-punctatis, intervallis minute punctatis. Long. 13 mill. Gabon. — Jolie et brillante es- pèce voisine de *Mechovi* Qued.

Photinus marcapatanus v. n. **infrapallidior** [Lam.]. Diffère de la forme typique par la forme plus raccourcie, le thorax plus large et le dessous plus clair. Pérou.

P. brunneohumeralis n. sp., du Brésil, voisin du pré- cédent, avec une forme moins large, a les élytres testacés seulement marginés de brun vers les épaules, le thorax plus étroit, brièvement marqué de foncé, le dessous du corps est foncé, avec l'abdomen ayant son 5^e segment marqué de blanc.

P. fulvobasalis n. sp. Elongatus, brunnescens, thorace flavo, in disco postice rufo-brunnescente, elytris elongatis, flavis, ad basin fulvo notatis, et in disco late piceo- brunneo vittatis, abdomine nigro, postice luteo. Long. 15 mill. Brésil. — Voisine de *simulans* E. Ol., espèce ca- ractérisée par sa coloration largement claire sur le dessus.

P. Fruhstorferi n. sp. Angustatus et elongatus, testaceus. Long. 6 m. Brésil. — Caractérisé par sa coloration claire jointe à sa forme élancée.

M. Pic.

